

**KÜMMERN SIE SICH
UM DIE EINFACHEN
DINGE, BEVOR SIE ZUM
PROBLEM WERDEN**



***HELICOBACTER PYLORI* RECHTZEITIG ERKENNEN**

SPRECHEN SIE MIT IHREM ARZT, WENN BEI IHNEN SOLCHE
ANHALTENDE SYMPTOME AUFTRETEN



Erfahren
Sie mehr



HEALTHY
STOMACH-
INITIATIVE

Dieses Material wurde von der HSI,
einer prominenten Gruppe bekannter
Gastroenterologie-Spezialisten
aus 80 Ländern, befürwortet.



ZEIGT SICH BEI IHNEN WIEDERHOLT EINES DER FOLGENDEN SYMPTOME?¹



Magenschmerzen oder
Sodbrennen



Überaus starkes Sättigungs-
gefühl nach dem Essen



Völlegefühl



Übelkeit




Häufiges Aufstoßen



Schnelles Sättigungs-
gefühl beim Essen

Ärzte bezeichnen diese als **dyspeptische Beschwerden** oder „**Dyspepsie**“.¹

SIE KÖNNEN DURCH EIN BAKTERIUM NAMENS *HELICOBACTER PYLORI* VERURSACHT WERDEN²



Darmbakterien spielen eine wichtige Rolle für Ihre Gesundheit³, *Helicobacter pylori* ist jedoch ein Bakterium, das Ihren Magen infizieren kann.²



Weltweit hat 1 von 2 Personen eine *Helicobacter-pylori*-Infektion⁴

EINE INFektion MIT *HELICOBACTER PYLORI* IST ZWAR HÄUFIG, SOLLTE ABER NICHT IGNORIERT WERDEN, DA SIE SCHWERWIEGENDE FOLGEN HABEN KANN²



MAGENGESCHWÜRE



MAGENKREBS

Zwar entwickeln nur 10 % der Infizierten ein **Geschwür** und nur 1–3 % entwickeln **Magenkrebs**, aber:⁵

90 % aller Magenkrebsfälle weltweit werden durch *Helicobacter pylori* verursacht.²

Die Wahrscheinlichkeit, an Magenkrebs zu erkranken, ist bei Infizierten etwa **6 mal höher** als bei Nichtinfizierten.⁶

DIE GUTE NACHRICHT IST, DASS DAS FRÜHZEITIGE ERKENNEN EINER INFektion DAZU BEITRAGEN KANN, DIE SCHWERWIEGENDEN FOLGEN VON *HELICOBACTER PYLORI* ZU VERHINDERN.⁷



WANN SOLLTEN SIE MIT IHREM ARZT ODER IHRER ÄRZTIN ÜBER *HELICOBACTER PYLORI* SPRECHEN?

Sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, wenn die Antwort auf eine dieser Fragen **JA** lautet.^{2,8}

SEITE
← 2

Hat sich bei Ihnen eines der auf Seite 2 genannten **Symptome** wiederholt gezeigt?



Nehmen Sie seit längerer Zeit **Medikamente** ein, um Ihre **Magenschmerzen** oder Ihr **Magenbrennen** zu lindern?



Gibt es bei Ihnen eine **familiäre Vorbelastung** von Magenkrebs?

Sprechen Sie auch mit Ihrem Arzt bzw. Ihrer Ärztin, wenn Sie weitere Informationen über dieses Bakterium wünschen.

WIE KANN MAN SICH BEI VERDACHT AUF EINE *HELICOBACTER-PYLORI*-INFektion TESTEN LASSEN?

Ihr Arzt bzw. Ihre Ärztin wird anhand Ihres Alters und Ihrer Symptome den richtigen Test für Sie auswählen. Unter den verfügbaren Tests sind einige **einfache und unkomplizierte**, wie z. B.:



ATMEN IN EIN BEHÄLTNIS.⁹

ODER



ABNAHME EINER BLUTPROBE.⁹

ODER



ABGABE EINER STUHLPROBE.⁹

HELICOBACTER PYLORI RECHTZEITIG ERKENNEN

Sprechen Sie mit Ihrem Arzt
oder Ihrer Ärztin



Haben Sie in der Zwischenzeit Fragen?
Dann scannen Sie hier und erfahren mehr.

Diese Broschüre wurde von JUVISE® Pharmaceuticals verfasst und finanziert.

1. Harer K, Hasler W. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2020;16:66-74. 2. Malfertheiner P et al. Nat Rev Dis Primers. 2023;9:19. 3. Zhang Y et al. Int J Mol Sci. 2015;16:7493-519. 4. Shirani M et al. BMC Infect Dis. 2023;23:543. 5. Wroblewski L et al. Clin Microbiol Rev. 2010;23:713-39. 6. Vohlonen I et al. ScandJ Gastroenterol. 2016;51:1159- 64. 7. Marginean C et al. Antibiotics (Basel). 2022;12:60. 8. Malfertheiner P et al. Gut. 2022; 71:1724-1762. 9. Sankaraman S, Moosavi L. StatPearls [Internet]. Urea breath test. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542286/> [Zuletzt aufgerufen im Dezember 2024].